

<i>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREANALITICOS. IACA LABORATORIOS. Procedimiento de Instrucciones para la preparación del paciente ante la toma de muestras. ANEXO 46: Antígeno Prostático Específico- PSA</i>	<i>Código: PRA-002-46 Versión: 1 Hoja: 1 de 1</i>
---	---

ANÁLISIS DE SANGRE PARA DETERMINACIÓN DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO - PSA

INSTRUCCIONES:

- *No mantenga relaciones sexuales 48 horas antes de realizar el análisis.*
- *No ande en bicicleta ni realice ejercicios físicos 48 horas antes del análisis.*
- *Concurra al Laboratorio, manteniendo un período de **ayuno de 8 a 14 horas**.
Cene de manera habitual y **cuente** las horas de ayuno a partir de finalizada la
cena.*
- *No supere las 14 horas de ayuno.*
- *No fume, ni beba café, té o mate durante el período del ayuno.*
- *Si lo desea puede beber agua.*
- *Informe al Laboratorio el nombre de los medicamentos que recibe o ha recibido
últimamente.*

Nota (1): *si se ha realizado un **tacto rectal** espere 1 semana para realizarse el
análisis*

Nota (2): *si se ha realizado una **biopsia rectal**, una **cirugía de próstata** o ha
padecido una infección urinaria, **espere de 3 a 6 semanas** antes de
realizarse el análisis*

Por favor, cumpla con estas instrucciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo.